

VOTRE GUIDE SUR
Pr **KISQALI**^{MD}





Pour mieux vous servir

Vous pourriez vous sentir dépassé(e) en prenant connaissance de votre diagnostic et de votre traitement. Il pourrait être difficile d'assimiler toute l'information fournie, et vous pourriez avoir des questions à poser.

C'est pourquoi nous avons préparé ce livret. Vous y trouverez :

- de l'information au sujet de votre diagnostic;
- de l'information au sujet du traitement; et
- des conseils sur le mode de vie ainsi que des outils.

N'oubliez pas : vous n'êtes pas seul(e). Si vous avez des questions ou si vous voulez recevoir des conseils, votre équipe de soins de santé et le personnel du programme de soutien aux patients Sentia sont toujours là pour vous aider.

Comprendre votre diagnostic

KISQALI^{MD} est utilisé chez les patients adultes atteints d'un cancer du sein qui s'est propagé à d'autres parties du corps. Le cancer du sein doit exprimer des récepteurs hormonaux (RH⁺), mais pas le récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2-). KISQALI^{MD} doit être employé en association avec :

- un inhibiteur de l'aromatase, classe d'agents utilisée comme première hormonothérapie chez les femmes et les hommes. Les patients doivent également prendre un médicament pour réduire la quantité d'œstrogènes (pour les femmes non ménopausées) ou de testostérone (pour les hommes).

OU

- le fulvestrant, qui est employé comme première hormonothérapie ou lorsque les autres traitements de ce type sont inefficaces. Les patientes doivent être ménopausées pour recevoir KISQALI^{MD} avec du fulvestrant.

Que signifie un diagnostic de cancer du sein avancé ou métastatique RH⁺/HER2-?

Métastatique L'adjectif « métastatique » (parfois remplacé par « avancé » ou « de stade 4 ») signifie que le cancer du sein s'est propagé à d'autres parties du corps.

RH⁺ Les récepteurs sont des protéines que l'on trouve à la surface ou à l'intérieur des cellules et qui se lient à certaines substances qui circulent dans le sang. Les cellules normales du sein et certaines cellules du cancer du sein présentent des récepteurs qui se lient aux hormones que sont les œstrogènes et la progestérone; leur croissance dépend de ces hormones. Les cancers du sein qui sont RH⁺ présentent des récepteurs des œstrogènes ou de la progestérone.

HER2 Les protéines HER2 sont des récepteurs qui se trouvent à la surface des cellules du sein et qui participent à la croissance normale des cellules. Le récepteur HER2 est aussi présent sur certaines cellules cancéreuses. On parle de cancer du sein HER2 négatif lorsque les cellules de cancer du sein n'ont pas le récepteur HER2.



Vous n'êtes pas seul(e).

Dans le cadre d'une étude menée aux États-Unis auprès de 487 patientes, environ **7 femmes** atteintes d'un cancer du sein métastatique **sur 10** étaient atteintes d'un cancer RH⁺/HER2-.

Le fait de connaître votre profil RH et HER2 aide les membres de votre équipe de soins de santé à définir votre plan de traitement.

Apprenez à connaître KISQALI^{MD}

Qu'est-ce que KISQALI^{MD} et comment agit-il?

KISQALI^{MD} est un médicament utilisé dans le traitement de votre type de cancer du sein particulier.

KISQALI^{MD} fait partie d'une famille de médicaments appelés *inhibiteurs de kinases*. Ces médicaments agissent en freinant la division et la croissance des cellules cancéreuses.

KISQALI^{MD} doit être employé avec un inhibiteur de l'aromatase ou du fulvestrant.

Lorsqu'il est administré avec l'un de ces médicaments, KISQALI^{MD} peut :

Ralentir la croissance des cellules de cancer du sein

Ralentir la propagation des cellules de cancer du sein

Avant de commencer à prendre KISQALI^{MD}

Que faut-il dire à votre médecin avant de commencer à prendre KISQALI^{MD}?

Pour essayer d'éviter les effets secondaires et assurer une utilisation appropriée du médicament, discutez avec votre médecin avant de commencer à prendre KISQALI^{MD}. Informez-le de toutes vos maladies et de tous vos problèmes de santé, notamment si :

- Vous avez de la fièvre, un mal de gorge ou des ulcères de la bouche en raison d'une infection (signes d'un faible taux de globules blancs).
- Vous avez actuellement ou avez déjà eu des problèmes de foie ou de rein.
- Vous avez actuellement ou avez déjà eu des problèmes cardiaques, comme des battements, une fréquence ou un rythme cardiaques irréguliers, ou de faibles taux de potassium, de magnésium, de calcium ou de phosphore dans le sang.
- Vous avez des antécédents familiaux de mort subite causée par un arrêt cardiaque.
- Vous êtes déshydraté(e), si vous souffrez de vomissements persistants ou d'un trouble alimentaire.
- Vous souffrez d'un diabète.
- Vous êtes atteint(e) d'une maladie appelée « neuropathie autonome », qui cause des problèmes de tension artérielle, de fréquence cardiaque, de transpiration, d'incontinence urinaire et anale et de digestion.
- Vous prenez des médicaments ou des suppléments.

Autres mises en garde que vous devez connaître :

Grossesse, allaitement et fertilité

- Si vous êtes enceinte, pensez l'être ou pourriez le devenir, vous devrez en discuter avec votre médecin parce que le traitement par KISQALI^{MD} pourrait comporter des risques particuliers.
- Il vous faudra éviter de devenir enceinte pendant votre traitement par KISQALI^{MD} parce que ce médicament pourrait être nocif pour l'enfant à naître.
- Si vous êtes apte à concevoir, votre médecin s'assurera que vous n'êtes pas enceinte avant que vous commenciez à prendre KISQALI^{MD}.
- Si vous êtes apte à procréer, vous devrez utiliser une méthode contraceptive efficace pendant toute la durée de votre traitement par KISQALI^{MD} et pendant au moins 21 jours après avoir pris votre dernière dose de ce médicament. Consultez votre médecin au sujet des moyens contraceptifs à votre disposition.
- Vous devez vous abstenir d'allaiter pendant votre traitement par KISQALI^{MD} et pendant 21 jours après avoir pris votre dernière dose de ce médicament.
- KISQALI^{MD} est susceptible de réduire la fertilité chez les patients de sexe masculin, ce qui peut affecter vos possibilités d'avoir un enfant. Discutez avec votre professionnel de la santé si cela vous pose un problème.

Conduite automobile et utilisation de machines

- KISQALI^{MD} peut entraîner de la fatigue et provoquer des évanouissements. Par conséquent, faites preuve de prudence si vous devez prendre le volant ou utiliser des machines pouvant être dangereuses pendant que vous prenez KISQALI^{MD}.

Informez votre médecin de tous les produits de santé que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels et les produits de médecine douce.



Quels tests devrez-vous subir?

Vous devrez vous soumettre à certains tests avant de commencer le traitement et une fois qu'il aura été amorcé. Ces tests devraient aider votre médecin à vérifier si vous présentez des effets secondaires. On procédera à deux types de tests :




Des tests sanguins, pour vérifier le fonctionnement de votre foie et mesurer les taux de certaines cellules sanguines et d'électrolytes (potassium, magnésium, calcium ou phosphore) dans votre sang.



Si votre médecin le juge nécessaire, vous pourriez continuer d'avoir à vous soumettre à des tests sanguins tout au long de votre traitement.



L'électrocardiographie (ECG), pour vérifier l'activité électrique de votre cœur.



Si votre médecin le juge nécessaire, vous pourriez continuer d'avoir à vous soumettre à des ECG durant votre traitement par KISQALI^{MD}.

Prendre KISQALI^{MD}

Comment faut-il prendre KISQALI^{MD}?



Prenez toujours KISQALI^{MD} en suivant exactement les directives de votre équipe de soins de santé.

- Votre médecin ou votre pharmacien vous dira combien de comprimés vous devez prendre en plus des autres médicaments et quels jours les prendre.
- En cas de doute, vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien.
- Ne modifiez pas la dose ni le schéma d'administration de KISQALI^{MD} sans en avoir parlé à votre médecin.
- Ne dépassez pas la dose recommandée prescrite par votre médecin.



Évitez de consommer des pamplemousses ainsi que le jus de ce fruit pendant le traitement par KISQALI^{MD}.

- Cela peut augmenter la quantité de KISQALI^{MD} dans la circulation sanguine et influencer la manière dont agit KISQALI^{MD}.



Prenez KISQALI^{MD} avec ou sans aliments, une fois par jour, pendant 21 jours consécutifs. Ensuite, vous cesserez de le prendre pendant 7 jours.



Prendre KISQALI^{MD} à la même heure du jour; cela vous aidera à vous souvenir du moment où vous devez prendre votre médicament, de préférence le matin.



Les comprimés doivent être avalés entiers (ils ne doivent pas être croqués, écrasés ni coupés avant d'être avalés).

- Il faut éviter d'ingérer un comprimé cassé, fissuré ou non intact.

Il est très important de suivre les conseils de votre médecin. Si vous présentez des effets secondaires, votre médecin pourrait vous demander de prendre moins de médicament, de sauter une dose ou de cesser le traitement.

Quelle est la dose habituelle de KISQALI^{MD}?

La dose de départ habituelle de KISQALI^{MD} est de 600 mg (3 comprimés de 200 mg) administrés par voie orale, une fois par jour. Continuez de prendre KISQALI^{MD} tant et aussi longtemps que votre médecin vous indique de le faire. KISQALI^{MD} doit être pris longtemps, possiblement durant plusieurs mois ou années. Votre médecin surveillera régulièrement votre état de santé pour s'assurer que le traitement a l'effet souhaité. Vous prendrez KISQALI^{MD} pendant 21 jours consécutifs, suivis d'une période de 7 jours sans traitement.

N'oubliez pas, KISQALI^{MD} est pris en association avec d'autres médicaments. Demandez à votre médecin de vous aider à remplir la section ci-dessous. Votre médecin peut vous en dire davantage sur la posologie de ces médicaments.

Schéma posologique recommandé (4 semaines)

KISQALI^{MD}

600 mg une fois par jour pendant 21 jours consécutifs suivis d'une période de 7 jours sans traitement



Je prends aussi _____ (inscrivez le médicament et la posologie).

Pour vous aider dans votre schéma d'administration du traitement, servez-vous du Journal de suivi du traitement que vous trouverez dans la pochette intérieure et qui vous permettra de faire le suivi de vos médicaments et de votre état.

Que faire si vous oubliez une dose de KISQALI^{MD}?

Vous avez oublié une dose?

Si vous vomissez après avoir pris une dose, ne prenez pas de nouvelle dose ce jour-là. Si vous avez oublié de prendre une dose, jetez les comprimés correspondant à cette dose oubliée.

Prenez la prochaine dose à l'heure habituelle le lendemain, jusqu'à la fin du traitement de 21 jours. Ne compensez pas une dose oubliée en prenant une dose supplémentaire et ne modifiez pas votre schéma d'administration. Ainsi, votre période de 7 jours sans traitement aura lieu au moment prévu.

Que faire en cas de surdose?

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez pris trop de KISQALI^{MD}, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

**L'arrêt du traitement
par KISQALI^{MD} peut
aggraver votre état.**

**N'arrêtez pas de prendre
KISQALI^{MD} à moins que
votre médecin vous
demande de le faire.**



Connaître les effets secondaires

Quels sont les effets secondaires graves?

Si vous ressentez n'importe lequel des effets secondaires graves suivants, **cessez de prendre KISQALI^{MD} et obtenez un avis médical immédiatement.**

Très fréquents :

- Démangeaisons, coloration jaune de la peau, nausées, vomissements, coloration jaune du blanc des yeux, perte d'appétit, douleur au ventre, urine foncée ou brune ou saignements ou bleus plus fréquents qu'en temps normal (signes de problèmes de foie)
- Douleur à la poitrine en respirant ou en toussant, confusion, toux pouvant produire des mucosités, fatigue, fièvre, transpiration et grands frissons, nausées, vomissements ou diarrhée, essoufflement (signes de pneumonie, une infection des poumons)
- Douleur abdominale, diarrhée, nausées et vomissements (signe de gastro-entérite, une infection de l'estomac et des intestins)
- Fièvre, sueurs ou frissons, toux, symptômes rappelant ceux de la grippe, perte de poids, essoufflement, présence de sang dans les expectorations, ulcères sur le corps, diarrhée ou maux de ventre, régions chaudes ou douloureuses sur le corps ou sensation de grande fatigue (signes d'infection)

Fréquents :

- Saignements spontanés ou apparition soudaine de bleus (signes d'un faible taux de plaquettes)
- Mal de gorge ou ulcères buccaux accompagnés d'un seul épisode de fièvre au cours duquel la température corporelle dépasse 38,3 °C (ou) d'une fièvre au cours de laquelle la température corporelle est supérieure à 38 °C pendant plus d'une heure, avec ou sans infection (signes de neutropénie fébrile)
- Battements de cœur irréguliers, faiblesse musculaire (signes d'un faible taux de potassium dans le sang)
- Crampes et spasmes musculaires, engourdissements et sensation de picotement dans les mains, les pieds et le visage (signes d'un faible taux de calcium dans le sang)
- Pertes de conscience (syncope)
- Douleur ou malaise à la poitrine, palpitations cardiaques, battements cardiaques rapides ou lents, étourdissements, sensation de tête légère, perte de conscience, mort subite (signes de troubles cardiaques)
- Battements cardiaques irréguliers, évanouissement, perte de conscience, convulsions (signes d'un allongement de l'intervalle QT [modifications de l'activité électrique de votre cœur])

Si vous ressentez de nouveaux symptômes ou si vos symptômes s'aggravent, informez-en immédiatement votre médecin. Il pourrait vous demander de prendre moins de médicament, de sauter une dose ou de cesser le traitement.

Peu fréquents :

- Douleur intense et soudaine à la poitrine et difficulté à respirer, crachats contenant du sang, respiration et battements cardiaques rapides (signes d'une embolie pulmonaire, un caillot sanguin dans un poumon)
- Fièvre ou étourdissements, frissons, température corporelle élevée ou très basse, émission d'urine faible ou nulle, hypotension, palpitations, respiration rapide, battements cardiaques rapides (signes de septicémie ou de choc septique, une infection du sang)

Fréquence inconnue :

- Éruption cutanée, rougeur de la peau, cloques sur les lèvres, les yeux ou la bouche, peau qui pèle, forte fièvre, symptômes rappelant ceux de la grippe et enflure des ganglions lymphatiques (nécrolyse épidermique toxique) (réactions cutanées graves)
- Difficulté à respirer, toux et essoufflement, fièvre, sensation de fatigue (signes de pneumonite ou de pneumopathie interstitielle, une inflammation du tissu pulmonaire)

Si vous ressentez n'importe lequel des effets secondaires graves suivants, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien dans tous les cas.

Très fréquents :

- Fatigue, manque d'énergie, faiblesse, essoufflement, pâleur de la peau (signes d'anémie, un faible taux de globules rouges)
- Douleur ou sensation de brûlure au moment d'uriner, présence de sang dans l'urine, envie fréquente d'uriner (signes d'infection des voies urinaires)

Fréquents :

- Sentiments de tristesse ou de désespoir qui durent longtemps (signes de dépression)
- Écoulement nasal ou nez bouché, mal de gorge, toux, congestion des sinus, douleurs corporelles, maux de tête, éternuements, fièvre, sensation de malaise général (signes d'infections des voies respiratoires)
- Sensation d'étourdissements (signes de vertige)

Quelles sont les mises en garde et les précautions importantes?

KISQALI^{MD} ne doit être prescrit et employé que sous la supervision d'un professionnel de la santé expérimenté dans le traitement médicamenteux du cancer.

Les effets secondaires graves suivants ont été observés chez les personnes qui prennent KISQALI^{MD} :

- **Troubles cardiaques :** douleur ou malaise à la poitrine, palpitations cardiaques, battements cardiaques rapides ou lents, étourdissements, sensation de tête légère, perte de conscience, mort subite
- **Trouble du foie :** démangeaisons, jaunissement de la peau et du blanc des yeux, urine foncée, douleur abdominale, nausées, vomissements, perte d'appétit
- **Diminution du nombre de globules blancs dans le sang :** fièvre, mal de gorge, ulcères buccaux ou autres signes d'infection

Quels sont les effets secondaires possibles?

Lorsque vous prenez KISQALI^{MD}, vous pourriez ressentir des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si c'est le cas, communiquez avec votre médecin.

- Douleur : abdominale, dos, cou, tête
- Constipation
- Toux
- Déshydratation
- Diarrhée
- Étourdissements ou sensation de tête légère
- Fièvre
- Perte ou raréfaction des cheveux et des poils
- Maux de tête
- Démangeaisons
- Ulcères dans la bouche accompagnés d'inflammation des gencives
- Nausées, vomissements
- Éruption cutanée
- Diminution de l'appétit
- Essoufflement, difficulté à respirer
- Enflure des mains, des chevilles ou des pieds
- Fatigue
- Difficulté à dormir
- Dérangement d'estomac, indigestion
- Faiblesse
- Sensation de perdre l'équilibre
- Sécheresse des yeux, de la bouche ou de la peau
- Décoloration de la peau par plaques (vitiligo)
- Rougeur de la peau
- Mal de gorge
- Goût étrange dans la bouche
- Yeux : larmolement; vision embrouillée, irritation oculaire, enflure et rougeur sous la paupière (conjonctivite)

KISQALI^{MD} peut entraîner des anomalies des résultats d'analyses sanguines et des modifications des signaux électriques du cœur. Votre professionnel de la santé vous fera subir divers examens et analyses avant et pendant votre traitement. Si les résultats sont anormaux, il vous dira si vous avez besoin d'un traitement ou non.

Programme de soutien aux patients Sentia

Tout comme les membres de votre équipe de soins de santé et vos proches, le personnel du programme de soutien aux patients Sentia est là pour vous aider. En vous inscrivant à ce programme gratuit, vous pourrez accéder à de nombreux services utiles, par exemple :



Vous pourriez obtenir un remboursement ou une aide financière afin de vous aider à recevoir KISQALI^{MD}



Des infirmières attitrées répondront aux questions que vous pourriez avoir



Des renseignements et des outils utiles vous sont offerts pour vous aider



Si vous avez des questions relatives à votre traitement, n'hésitez pas à communiquer avec nous au **1 855 736-8421**.

Tél. : 1 855 SENTIA-1 (1 855 736-8421)

Télééc. : 1 866 636-8421

psp@sentia-exp.ca

**Du lundi au vendredi,
de 8 h à 20 h HNE**

Parler à vos proches

Il ne sera pas nécessairement facile de parler de votre diagnostic et de votre traitement avec les membres de votre famille et vos amis. Nous avons donc préparé une liste de points dont vous devriez tenir compte :

- Vos proches pourraient avoir besoin de temps pour se faire à la nouvelle. Ils auront à surmonter leurs propres sentiments.
- Faites-leur comprendre qu'ils peuvent vous aider simplement en étant eux-mêmes et en étant à l'aise en votre compagnie.
- Demandez à vos proches de vous écouter quand vous en avez besoin, plutôt que de tenter de résoudre tous vos problèmes.
- En n'oubliant pas que chacun gère les difficultés à sa façon, vous et vos proches aurez plus de facilité à vivre vos émotions. Les gens sont nombreux à se sentir rassurés en partageant leurs sentiments et en prenant le temps de dire ce qu'ils ont sur le cœur.
- Dites-leur s'ils peuvent vous poser des questions ou vous dire comment ils se sentent. Il suffit parfois de leur rappeler que vous avez besoin de leur soutien.



Conseils pour les rencontres avec votre équipe de soins de santé

Voici quelques conseils pour **tirer pleinement parti de vos visites** avec votre équipe de soins de santé.

- Dressez la liste de vos questions avant chaque rendez-vous.
- Présentez-vous à vos visites médicales en compagnie d'un membre de votre famille ou d'un ami de confiance. Cette personne peut vous aider à vous rappeler ce que le médecin ou l'infirmière a dit et en parler avec vous une fois la visite terminée.
- Posez toutes vos questions. Si vous ne comprenez pas une réponse, continuez de poser des questions jusqu'à ce qu'elle se soit éclaircie. Il n'y a pas de questions « stupides ».
- Prenez des notes. Vous pouvez le faire vous-même ou demander à un membre de votre famille ou à un ami de le faire pour vous. Vous pouvez demander si vous pouvez les enregistrer.
- Obtenez le numéro de téléphone d'une personne que vous pourrez appeler si vous avez des questions.
- Organisez un dossier ou un carnet contenant tous les documents et résultats de tests que votre médecin vous remet. Apportez-le lors de vos visites. Consignez également toutes vos visites dans un journal ou un aide-mémoire. Prenez note des médicaments que vous avez reçus et des tests que vous avez subis.
- Inscrivez tous les symptômes ou effets secondaires dérangeants que vous ressentez, en prenant soin d'indiquer où et à quel moment ils se manifestent. Apportez cette liste lors de vos visites.
- Vérifiez ce que vous devez faire en cas d'urgence, y compris à qui téléphoner, comment entrer en contact avec eux et où vous rendre.



Votre journal de suivi du traitement

Il est important de suivre votre traitement tel que vous l'a recommandé votre médecin et de communiquer avec ce dernier. Ce journal peut vous aider à consigner et à clarifier vos idées de sorte à faciliter la conversation lors de vos rendez-vous avec votre équipe de soins de santé.

Vous trouverez un Journal de suivi du traitement dans la pochette de la présente brochure.



Vous déciderez vous-même de ce que vous inscrivez dans **votre journal**, mais voici quelques façons dont il pourrait vous servir.

Sur le calendrier :

- Faites le suivi, de jour en jour, de votre traitement par KISQALI^{MD}.
 - N'oubliez pas que vous prenez KISQALI^{MD} pendant 21 jours consécutifs, pour ensuite cesser de le prendre durant 7 jours à chaque cycle.
- Consignez les jours où le fulvestrant vous est administré par votre équipe de soins de santé OU les jours où vous avez pris un inhibiteur de l'aromatase.
- Indiquez les autres médicaments que vous avez pris.
- Écrivez comment vous vous sentez et indiquez tout symptôme ou effet secondaire dans les espaces prévus à cette fin sur le calendrier.

Dans la section réservée aux notes :

- Écrivez les questions que vous souhaitez poser à votre équipe de soins de santé.
- Prenez note des points importants que vous abordez pendant vos rendez-vous.

Le **Journal de suivi du traitement** vous aidera à vous rappeler quand vous devez prendre KISQALI^{MD} et vous aidera durant vos conversations avec les membres de votre équipe de soins de santé.

Rappel :

KISQALI^{MD} est utilisé en association avec d'autres médicaments. Les femmes qui ne sont pas encore ménopausées doivent prendre aussi un médicament qui empêchera leurs ovaires de produire des œstrogènes. Informez-vous auprès de votre médecin ou de votre pharmacien pour obtenir de plus amples renseignements sur les médicaments que vous prenez.

 Pr **KISQALI**^{MD}
ribociclib

Obtenir du soutien

Il est important que vous sachiez que vous n'êtes pas seul(e). Certaines personnes se tournent vers leurs amis et les membres de leur famille pour recevoir du soutien. D'autres préfèrent intégrer un groupe de soutien et échanger avec des personnes qui vivent des difficultés similaires. Vous pouvez demander à votre équipe de soins de santé de vous parler des groupes de soutien de votre région. Vous pourriez aussi vous joindre à un groupe de soutien en ligne et discuter avec les gens dans le confort de votre domicile.

Voici quelques sources d'information que vous pourriez trouver utiles :

À l'échelle nationale :

- Société canadienne du cancer à cancer.ca
- Réseau canadien du cancer du sein à cbcn.ca
- rethink Breast Cancer à rethinkbreastcancer.com (en anglais seulement)

À l'échelle provinciale :

- BC Cancer à bccancer.bc.ca (en anglais seulement)
- Action Cancer Ontario à cancercareontario.ca/fr
- Fondation cancer du sein du Québec à rubanrose.org



Novartis Pharma Canada inc.
700, rue Saint-Hubert, bureau 100
Montréal (Québec) H2Y 0C1
www.novartis.ca

Téléphone : 514 631-6775 Télécopieur : 514 631-1867
Téléphone de l'Information médicale : 1 800 363-8883
ou medinfo.canada@novartis.com

© Novartis Pharma Canada inc. 2026.
Tous droits réservés.
MD KISQALI est une marque déposée.

janvier/2026 – FA-11549566F

